

NIKKO

外用殺菌消毒剤

ハイポエタノール液2%

「ニッコー」

HYPO ETHANOL SOLUTION 2%

飲用不可

500mL

2009年9月 作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22100AMX01671
薬価収載	2009年9月
販売開始	2009年9月

貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を選けて保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)



製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】

1. 組成
本品100 mL中 チオ硫酸ナトリウム水和物 2g
及び添加物としてエタノール 含有。
2. 製剤の性状
本品は無色澄明な液で特異臭がある。
比重 d_{20}^{20} :0.910 ~ 0.930
pH: 6.0 ~ 7.5

【効能・効果】

皮膚面及び手術用器具類・布類に付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱色、消毒。

【用法・用量】

ヨードチンキ塗布による皮膚面(手術部位及び手術者の皮膚)及び手術用器具類・布類に付着したヨウ素の脱色並びに消毒剤として塗布または洗浄等にそのまま使用。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちにによく水洗すること。
 - (2) 広範囲または長期間使用する場合には蒸気の吸入に注意すること。
[エタノール蒸気に大量にまたは繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]
2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
- | | |
|-------------------|------|
| | 頻度不明 |
| 過敏症 ^{注)} | 発疹等 |
| 皮膚 ^{注)} | 刺激症状 |

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

- (1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (2) 血清、胆汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- (3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (4) 本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メスを使用する場合には、本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び多くのウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

1. 結晶が析出した場合には少し加温し、溶解すること。
2. 飲用不可



キャップ:PP
容器:PE

製造番号

使用期限



(01)14987291864114

987291864114

4