

# マルチビタミンゴールドEX

## MULTIVITAMIN GOLD-EX


### “インナーバランスサポート”のマルチビタミン&ミネラル

#### ○若い女性を中心とした野菜不足を考慮したインナーバランスサポート

日本人は、若い女性を中心とするすべての世代において野菜の摂取量が不足しがちです。普段から野菜をしっかりと摂取することが大切ですが、ちょっと体が疲れぎみ、食欲がない、栄養不足が気になるといったときは、インナーバランス（栄養のバランス）を考え、マルチビタミン&ミネラルがきちんと配合されたマルチビタミンゴールドEXが有効です。

#### ○体が必要としているときだからこそ、しっかり配合された栄養成分

私たちは、疲れた時、妊娠・授乳期、発育期、病中病後などは、ビタミン&ミネラルなどの栄養成分が普段より多く必要となります。マルチビタミンゴールドEXは、そんな時のインナーバランスを考えて妊娠・授乳期には特に必要となる葉酸をはじめマルチビタミン&ミネラルをしっかり配合しています。



### ⚠ 使用上の注意

#### 🗨️ 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。（妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000I.U.（国際単位）以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。）

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状       |
|-------|-----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐     |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

### ■ 効能・効果

#### ●成人（15才以上）の場合：

- 肉体疲労・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 滋養強壮、虚弱体質

#### ●小児（7才～14才）の場合：

- 小児の発育期・偏食児・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・栄養障害などの場合の栄養補給
- 滋養強壮、虚弱体質

## 用法・用量

次の1回量を1日1回服用します。

| 年齢  | 成人（15才以上） | 7才～14才 | 7才未満    |
|-----|-----------|--------|---------|
| 1回量 | 2錠        | 1錠     | 服用しないこと |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)服用の前後30分は、お茶・コーヒー等を飲まないでください。（鉄分の吸収が悪くなる場合があります。）

## 成分 2錠（成人1日量）中

### ビタミン

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ビタミンA油                                       | 1.975mg（ビタミンAとして2,000I.U.） |
| ビスベンチアミン（ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体）             | 25mg                       |
| リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）                  | 6mg                        |
| ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）               | 25mg                       |
| シアノコバラミン（ビタミンB <sub>12</sub> ）               | 60μg                       |
| ニコチン酸アミド                                     | 50mg                       |
| 葉酸   | 400μg                      |
| アスコルビン酸（ビタミンC）                               | 150mg                      |
| コレカルシフェロール（ビタミンD <sub>3</sub> ）              | 5μg（ビタミンDとして200I.U.）       |
| トコフェロールコハク酸エステルカルシウム<br>（ビタミンEコハク酸エステルカルシウム） | 10.36mg                    |
| ビオチン   | 60μg                       |

### ミネラル

|              |         |
|--------------|---------|
| 沈降炭酸カルシウム    | 86.4mg  |
| 無水リン酸水素カルシウム | 85mg    |
| 炭酸マグネシウム     | 120.2mg |
| フマル酸第一鉄      | 30mg    |

添加物として、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、D-マンニトール、カルナウバロウ、ショ糖脂肪酸エステル、タルク、酸化チタン、部分アルファー化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ラウリン酸ソルビタン、ビタミンEを含有します。

○本剤配合成分のビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがあります。

○本剤配合成分の鉄分により、便が黒色になることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のみ詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

